

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

A-COOP クミアイ
目薬クール

目薬

特徴

- 目の疲れをはじめとする様々な目の不快な症状を、さわやかな清涼感とともにやわらげる目薬です。
- アレルギーや眼精疲労などによる結膜充血を除去します。
- 清涼感のあるスッキリとしたさし心地です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量 100mL中

成分	含量	はたらき
L-アスパラギン酸 マグネシウム・カリウム (等量混合物)	2,000mg	目に栄養を与えて新陳代謝をよくし、弱った目の機能を回復します。
アラントイン	300mg	結膜の炎症をしずめ、目に生じた傷やただれを治します。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	1mg	ピントの調節を支配する神経に直接働いて、ピントを調節し、かすみ目や疲れ目を改善します。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により充血を取り除き、炎症をしずめて目をスッキリさせます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	20mg	目の炎症、かゆみなどの不快な症状を取り去り、目をスッキリとさせます。

添加物として、ホウ酸、 α -メントール、ハッカ油、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、ポリソルベート80を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930