

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



第3類医薬品

新ビタミンE300

（ビタミンE主薬製剤）

特徴

- ビタミンEの中でも体内での効力が最も優れているα型の天然ビタミンE (d-α-トコフェロール) を用いています。
- 自律神経系を整える働きがあり、ビタミンEの働きをよりシャープにするγ-オリザノールを配合しました。
- 飲みやすいソフトカプセル剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：
老年期



肩・首すじのこり



冷え、手足のしびれ



老年期

用法・用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	1カプセル	1日2~3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

カプセル剤の取り出し方

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量(3カプセル)中

成分	含量	はたらき
d- α -トコフェロール	300mg	<ul style="list-style-type: none">○末梢血管の血行を良くして、肩・首すじのこり、手足のしびれや冷えなどをやわらげます。○ホルモン分泌器官(脳下垂体、副腎など)の働きを助け、ホルモンバランスの乱れにより起こる更年期の症状や月経不順といった不快な症状をやわらげます。○体内の酸化を防ぎ、動脈硬化や血行障害の原因にもなる過酸化脂質の増加を防止します。
γ -オリザノール	10mg	自律神経を整えると共にビタミンEの効果を高めます。

添加物として、コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎0238(46)2013
月~金曜日 9:00~17:00(祝日を除く)

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚 930