

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



かぜカプセル「ゴールド」s

総合感冒薬

第②類医薬品

特徴

- かぜの諸症状に有効な9成分が不快なかぜの症状を緩和する総合感冒薬です。
- 古くから高貴薬として用いられてきた、解熱・鎮静効果のある“ゴオウ”、滋養強壮効果の高い“ニンジン”の2つの生薬を配合しました。
- プロムヘキシン塩酸塩がたんの絡むつらいせきを鎮めます。また、かぜをひいたときに消耗しがちなビタミンB₂を補い、かぜの治りを早めます。



使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 次の方は服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 12歳未満の小児
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)
 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
 5. 服用前後は飲酒しないでください。
 6. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死剥離症、急性汎発性発疹性膿疱症)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	2カプセル	1日3回
12歳~14歳	1カプセル	
12歳未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) カプセル剤の取り出し方

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量(6カプセル)中

成分	含量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	22.2mg	せきを止めます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支の緊張をやわらげてせきをはずめ、たんを切り取ります。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	たんの粘りをうすめ、たんを出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンを補います。
ゴオウ	3mg	解熱・鎮静作用があります。
ニンジン乾燥エキス	58mg	かぜに対する抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。 (原生薬812mg相当)

添加物として、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有する。

(成分・分量に関連する注意)

リボフラビン(ビタミンB₂)により尿が黄色くなることがありますが、心配はありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎0238(46)2013
月~金曜日 9:00~17:00(祝日を除く)

製造販売者 **協同薬品株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大家 930