

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

複合胃腸薬

新グリーン胃腸薬DX

第2類医薬品

新グリーン胃腸薬DXは、消化酵素をはじめ、健胃生薬、制酸剤、粘膜修復のはたらきをもつ成分をバランスよく配合した複合胃腸薬です。胃もたれ、飲みすぎ、食べすぎ、胸やけなどの胃の不快な症状の緩和にお役立てください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

(裏面もお読みください。)

用法・用量

次の量を、食前又は食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用させないこと	

●食前とは、食事の1時間から30分位前のことです。

●食後とは、食事のあと、30分位のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 3包(成人1日量)中 (1包:1.05g)

成 分	分 量	は た ら き
乾燥水酸化アルミニウムゲル	360mg	胃酸を中和します。
沈降炭酸カルシウム	1080mg	
ケイヒ末	200mg	芳香健胃薬で、消化液の分泌を促します。
ゲンチアナ末	50mg	苦味健胃薬で、消化液の分泌を促します。
ショウキョウ末	100mg	芳香辛味健胃薬で、消化液の分泌を促します。
チョウジ末	50mg	芳香健胃薬で、消化液の分泌を促します。
ピオチアスターゼ2000	60mg	でんぷん、たんぱく質、せんい素の消化を助けます。
リパーゼAP6	60mg	脂肪の消化を助けます。
アルジオキサ	150mg	あれた胃粘膜を修復します。
銅クロロフィリンカリウム	40mg	胃の粘膜を修復、保護します。
ジメチルポリシロキサン	90mg	消化管内のガスの排出を促進し、腹部膨満感を解消します。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ポビドン、ケイ酸Ca、l-メントール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口: 電話(076)435-5055

午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1